

แมลงปอบ้าน

แมลงปอบ้าน *Neurothemis tullia tullia* (Drury) ตัวเต็มวัยยาวประมาณ 2.5-2.7 เซนติเมตร มีลวดลายและสีแตกต่างกันเห็นชัดเจน เพศผู้ปีกหน้าและปีกหลังครึ่งหนึ่งจากโคนปีกมีสีดำ ปลายปีกใสและขอบปลายปีกด้านบนทั้งสองข้างมีสีดำ เพศเมียลำตัวมีสีดำเฉพาะตรงกลางและปลายปีก เป็นตัวห้ำของผีเสื้อหนอนกอข้าวและตัวเต็มวัยของแมลงศัตรูข้าวอื่นๆ พบทั่วไปในนาข้าว บินอยู่ส่วนบนของต้นข้าว โฉบจับเหยื่อกินเป็นอาหาร เริ่มพบตั้งแต่ข้าวยังเล็ก



ตัวเต็มวัยแมลงปอบ้าน

แมลงปอเข็ม

แมลงปอเข็มที่พบมี 2 ชนิด คือ *Agriocnemis pygmaea* Rambur และ *Agriocnemis femine femine* (Brauer) ตัวเต็มวัยมีปล้องท้องยาวประมาณ 1.6-1.8 เซนติเมตร ส่วนหัว ออก และท้องมีลวดลายสีเขียวเหลืองสลับดำ ส่วนท้องรูปร่างเรียวยาว ตัวผู้มักมีสีสดใสกว่าตัวเมีย

แมลงปอเข็ม *A. pygmaea* ส่วนปลายของปล้องท้องมีสีส้ม ในขณะที่ *A. femine femine* ตัวผู้ปล้องท้องส่วนปลายและส่วนอกด้านข้างมีสีน้ำเงินแกมเขียว ตัวเมียมีสีเขียว

แมลงปอเข็ม เป็นตัวห้ำกินผีเสื้อหนอนกอใบข้าว และแมลงศัตรูข้าวอื่น พบทั่วไปในนาข้าว ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ตามปกติจะบินอยู่ตามบริเวณส่วนกลางกอข้าวเพื่อค้นหาเหยื่อ ขณะผสมพันธุ์สามารถบินเคลื่อนย้ายหนีศัตรูได้



ตัวเต็มวัยแมลงปอเข็ม

