

มวนเขียวดูดไข่

มวนเขียวดูดไข่ *Cyrtorhinus lividipennis* ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของมวนเขียวดูดไข่มีสีเขียว ตัวเต็มวัยขนาดยาวประมาณ 2.5 มิลลิเมตร หนวด หวี และอกสีดำ เพศผู้โคนปีกหน้าสีเขียว ปลายปีกสีเทาหรือดำอ่อน เป็นตัวห้ำดูดกินไข่เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยจักจั่น ทำให้ไข่แพบ มวนตัวห้ำนี้เป็นศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่สำคัญมาก ส่วนใหญ่แพร่กระจายในภาคกลาง ในต้นฤดูปลูกข้าว จะอพยพเข้ามาในนาข้าวพร้อมกับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ถ้ามีมวนตัวห้ำมากกว่าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 2-3 เท่า ก็จะสามารถควบคุมไม่ให้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพิ่มปริมาณจนถึงระดับทำความเสียหายแก่ข้าวได้



© ลิขสิทธิ์สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

ตัวเต็มวัยมวนเขียวดูดไข่



ลักษณะการห้ำของมวนเขียวดูดไข่

มวนดูดไข่

มวนดูดไข่ *Tytthus chinensis*(stail) ตัวเต็มวัยขนาดใกล้เคียงกับมวนเขียวดูดไข่ เพศผู้ยาวประมาณ 2.1 มิลลิเมตร ขาทัง 3 คู่ ตั้งแต่ปลายฟีเมอร์ถึงทาร์ไซมีสีน้ำตาล ปีกหน้าสีน้ำตาลอ่อนตลอดทั้งปีก เป็นตัวห้ำทำลายไข่เพลี้ยกระโดดและเพลี้ยจักจั่น เช่นเดียวกับมวนเขียวดูดไข่ มีเขตแพร่กระจายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาคกลางพบน้อยมากเมื่อเทียบกับมวนเขียวดูดไข่



ตัวเต็มวัยมวนดูดไข่



ไข่เพลี้ยกระโดดที่ถูกมวนดูดไข่ทำลาย