

แตนเบียนไข่หนอนกอ

แตนเบียน *Telenomus rowani* (Gahan) ตัวเต็มวัยของแตนเบียนมีขนาดยาวประมาณ 0.8-1.0 มิลลิเมตร หนวด 4 ปล้องแรก สีน้ำตาลหักเป็นข้อศอก ตาสีดำ ขาทั้ง 3 คู่ สีน้ำตาลอ่อน ส่วนหัว ออกและท้อง มีสีดำ ปีกใส ไม่มีเส้นปลายท้องแหลม เป็นแตนเบียนที่วางไข่ ทำลายไข่ของหนอนกอสีครามและ หนอนกอแถบลาย อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวเต็มวัยของแตนเบียนนี้บางครั้งจะเกาะติดกับขนที่กันของผีเสื้อหนอนกอ เมื่อผีเสื้อวางไข่แตนเบียนก็จะเข้าทำลายทันที



T. rowani (Gahan) ทำลายไข่หนอนกอสีคราม

แตนเบียน *Tetrastichus schoenobii* Ferriere ตัวเต็มวัยมีขนาดประมาณ 1.4 มิลลิเมตร สีน้ำเงินแกมเขียวเป็นเงา หนวดสีน้ำตาล โคนหนวดสีเหลือง ขาสีเหลือง ปีกใสไม่มีเส้นปีก เป็นแตนเบียนไข่หนอนกอสีครามที่สำคัญ เนื่องจากกลุ่มไข่ของหนอนกอที่ถูกทำลาย ส่วนใหญ่จะถูกทำลายเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์



ตัวเต็มวัยแตนเบียน *T. schoenobii* Ferriere

แตนเบียนหนอนกอ

แตนเบียน *Tropobracon schoenobii* (Viereck) ตัวเต็มวัยมีขนาดยาวประมาณ 5-6 มิลลิเมตร สีน้ำตาลแดง เพศเมียมีอวัยวะวางไข่สีดำนอกมาจากส่วนท้อง ยาวประมาณ 1.2 มิลลิเมตร หนวดสีน้ำตาล ยาวเรียวยาวเท่าหรือเกือบเท่ากับลำตัว ท้องปล้องแรกที่ติดกับส่วนอกจะคอดเล็กน้อย เป็นแตนเบียนทำลายหนอนกอโดยเพศเมียแทงอวัยวะวางไข่เข้าไปในต้นข้าว และวางไข่ 1 ฟอง ในหนอนกอแต่ละตัวได้ถึง 20 ฟอง หนอนของแตนเบียนจะอาศัยอยู่และกัดกินภายในตัวหนอนกอ ต่อมาจะกัดผนังของหนอนกอออกมาเข้าดักแต่ข้างนอก ตัวเต็มวัยแตนเบียน อายุ 7-10 วัน



ตัวเต็มวัยแตนเบียน *T. schoenobii* (Viereck)

แตนเบียน *Temelucha stangi* (Ashmead) ตัวเต็มวัยมีขนาดยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร สีน้ำตาลดำ ส่วนปล้องท้องมีสีน้ำตาลแดง มีสีน้ำตาลดำแถบพาดขวางเป็นช่วงๆ เป็นแตนเบียนของหนอนกอแถบลาย หนอนกอสีคราม และหนอนห่อใบข้าว



ตัวเต็มวัยแตนเบียน *T. stangi* (Ashmead)